CZY PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

MOŻNA ZACHOWAĆ PŁODNOŚĆ



JEŚLI ROZPOZNANO U CIEBIE NOWOTWÓR,
JESTEŚ W WIEKU ROZRODCZYM
I ROZWAŻASZ MOŻLIWOŚĆ
POWIĘKSZENIA RODZINY,
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TE ULOTKĘ.

Leczenie onkologiczne może pogarszać funkcje rozrodcze lub nawet powodować niepłodność. Stopień uszkodzenia gonad (jajników lub jąder) jest uzależniony od typu nowotworu, wieku w chwili rozpoznania oraz rodzaju i intensywności leczenia. Utrata płodności może mieć charakter czasowy lub trwały. U kobiet usunięcie narządów rodnych lub zastosowanie radioterapii na okolicę miednicy powoduje trwałą niepłodność, natomiast niektóre leki przeciwnowotworowe mogą - zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn - trwale lub przejściowo zahamować czynność gonad.

Rozpoznanie nowotworu jest dla każdej dotkniętej tym osoby i jej rodziny trudnym przeżyciem. W tym momencie wszystkie dotychczasowe plany życiowe, w tym rozrodcze, wydają się często mało istotne. Większość chorych po zakończeniu leczenia wraca jednak do normalnego życia, zatem o planach rozrodczych trzeba pomyśleć jak najwcześniej.

Co ważne, niewielkie odroczenie rozpoczęcia leczenia onkologicznego w celu zmniejszenia ryzyka niepłodności nie zmniejsza szansy wyleczenia, a ewentualna przyszła ciąża nie zwiększa ryzyka nawrotu nowotworu.

Obecnie dostępne są różne sposoby zwiększające możliwość zachowania płodności po leczeniu onkologicznym. Zachęcamy do porozmawiania o tym ze swoim lekarzem oraz do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Polskiej Ligi Walki z Rakiem.







+48 793 555 238

SKORZYSTAJ TAKŻE Z NASZEJ INFOLINII: WE WTORKI I CZWARTKI W GODZINACH 17:00 – 19:00





